

QUÉ HACER EN UNA EMERGENCIA DE DIENTES DE LECHE DE SU NIÑO



PRIMERO

Si la boca de su hijo está sangrando, enjuague con agua y aplique una compresa fría. Esto ayudará con el sangrado y la hinchazón.



SEGUNDO

Llame al dentista y consuele a su hijo. Verifique si hay otras lesiones que puedan necesitar atención inmediata.



TERCERO

Si el diente está astillado o lo ha expulsado, busque las piezas o el diente entero. No vuelva a colocar el diente en el alvéolo (la cavidad que quedó donde estaba el diente). Si no puede encontrar el diente, es posible que su hijo necesite una radiografía para asegurarse de que el diente no esté en sus pulmones.



CUARTO

Acuda al consultorio dental a la cita que le den.



QUÉ HACER EN UNA EMERGENCIA DENTAL PARA ADULTOS

- ✓ Si la boca de su hijo está sangrando, enjuague con agua y aplique una compresa fría. Esto ayudará con el sangrado y la hinchazón.
- ✓ Llame al dentista y consuele a su hijo. Verifique si hay otras lesiones que puedan necesitar atención inmediata.
- ✓ Si el diente está astillado o lo ha expulsado, busque las piezas o el diente entero. Si no puede encontrar el diente, es posible que su hijo necesite una radiografía para asegurarse de que el diente no esté en sus pulmones.
- ✓ Solo sostenga el diente por la corona, no por la raíz. Si el diente está sucio, enjuague suavemente con agua.
- ✓ Vuelva a colocar el diente en su cavidad en la posición correcta y muerda suavemente una gasa o un paño limpio para mantenerlo en su lugar.
- ✓ Si no puede volver a colocar el diente en el alvéolo (la cavidad donde estaba), póngalo en un recipiente con leche y llévelo al dentista.
- ✓ Acuda al consultorio dental a la cita que le den. Preferiblemente en las primeras 1-2 horas.

